



MEDIZINISCHE HAUTPFLEGE

Magistrale Rezeptur

benevi neutral® KOPF-LOTION

Prednicarbat (0,25 %) in benevi neutral® KOPF-LOTION

Allgemeine Hinweise

- Rezeptierbarer Bereich von Prednicarbat nach DAC / NRF: 3,5 – 8,0
- benevi neutral® KOPF-LOTION liegt im pH-Bereich 5,0 – 6,0

Rezepturbestandteile

Prednicarbat (mikronisiert)	0,125 g
benevi neutral® KOPF-LOTION	ad 50,0 g

Herstellanweisung für 50 g Zubereitung

Herstellung zum Beispiel im CITO Unguator® E100, Suspensionsprogramm Stärke 10-12

- ca. 25 g benevi neutral® KOPF-LOTION einwiegen
- Prednicarbat zugeben, restliche Menge benevi neutral® KOPF-LOTION hinzufügen
- Dispergieren mit dem Suspensionsprogramm Stärke 10-12
- Wirkstoffverteilung unter dem Mikroskop kontrollieren

Stabilität

Die Zubereitung ist über 6 Wochen galenisch stabil.

Die galenische Stabilität dieser Zubereitung wurde bei der Firma BSI Beauty Science Intelligence GmbH in Langenhagen geprüft.

Literatur

1. GD Gesellschaft für Dermopharmazie: Leitlinie „Dermatologische Rezepturen“ (2017) www.gd-online.de
2. GD Gesellschaft für Dermopharmazie. Empfehlungen, „Wirkstoffdossiers für externe dermatologische Rezepturen“ (2013). www.gd-online.de
3. G. Wolf, R. Süverkrüp: Rezepturen, Probleme erkennen, lösen, vermeiden. Deutscher Apotheker Verlag Stuttgart (2013)